

## **BIPACKSEDEL**

### **Famvir 125 mg, 250 mg och 500 mg filmdragerade tabletter**

*Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.*

#### **Vad innehåller läkemedlet?**

*Verksamt ämne:* Famciklovir 125 mg, 250 mg eller 500 mg.

*Övriga ämnen:* Hydroxypropylcellulosa, vattenfri laktos (125 mg och 250 mg tabl.), natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 4000 och 6000, titandioxid (E171).

#### **Hur verkar läkemedlet?**

Famvir har sin effekt inne i virusinfekterade celler och hämmar herpesvirusets förmåga att föröka sig.

#### **Innehavare av försäljningstillstånd**

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby

#### **Vad används läkemedlet för?**

Famvir används vid behandling av bältros (herpes zoster) och herpes infektion på könsorganen (genital herpes).

#### **När skall läkemedlet inte användas?**

Använd inte läkemedlet om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot Famvir eller mot penciklovir (Vectavir).

#### **Att tänka på innan och när läkemedlet används**

Om du har nedsatt njurfunktion bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Famvir påbörjas eftersom dosen då kan behöva minskas.

Genital herpesinfektion kan överföras till din partner vid sexuell kontakt. Undvik sexuell kontakt även om du har påbörjat behandling.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

#### **Graviditet**

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare om du är gravid eller tror att du kan vara det.

#### **Amning**

Okänt om Famvir går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

## Trafikvarning

Vid behandling med Famvir kan, hos vissa patienter, reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

Effekten av behandlingen kan påverkas om Famvir och andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare, om du använder andra läkemedel, innan behandling med Famvir påbörjas.

## Dosering

Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Följ läkarens instruktion om hur och när tablettarna skall tas.

### *Vid normalt immunförsvar*

*Bältros:* 500 mg 3 gånger dagligen i 7 dagar. Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt inom 72 timmar efter den första blåsans uppträdande. Tablettarna intas morgon, eftermiddag och vid sänggående (ca 8 timmar mellandoser).

*Genital herpes: Förstagångsbehandling:* 250 mg 3 gånger dagligen i 5 dagar. Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt inom 72 timmar efter den första blåsans uppträdande. *Återkommande behandling:* 250 mg 2 gånger dagligen (ca 12 timmar mellan doserna). Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt, eller inom 6 timmar efter den första blåsans uppträdande.

### *Vid nedsatt immunförsvar*

*Bältros:* 500 mg 3 gånger dagligen i 10 dagar. Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt efter den första blåsans uppträdande.

*Herpes simplex infektion: Vuxna:* 500 mg 2 gånger dagligen i 7 dagar. Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt efter den första blåsans uppträdande.

- Om du har glömt att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Ta sedan nästa tablett vid normal tid och fortsätt som tidigare.
- Fortsätt att ta tablettarna även om du inte känner dig bättre. Det kan ta några dagar innan symptomen lindras.
- Tablettarna skall sväljas hela med vatten. Det är inte nödvändigt att ta tablettarna tillsammans med måltid.

## Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

## Biverkningar

*Vanliga (fler än 1 av 100):* Huvudvärk, illamående, kräkning, diarré, förstoppning, buksmärta, feber, ökad svettning.

*Sällsynta (färre än 1 av 1000):* Förvirring, yrsel, dåsighet, trötthet, hallucinationer, hudutslag, hudklåda, nässelutslag.

Följande biverkningar har rapporterats mycket sällan: Påverkan på blodbilden (minskat antal blodkroppar), allvarliga hudreaktioner, gulsot, onormala leverfunktionstest.

### **Förvaring och hållbarhet**

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvara tablettorna vid högst 30°C och i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn - helst i låst skåp.

Överbliven medicin lämnas till apotek för förstöring.

**Bipacksedeln senast reviderad: 2007-04-04**